


Broadline®

ПЕРЕВАГИ


- Бродлайн — новітній препарат, розроблений спеціально для котів
- Широкий спектр дії — від 22 внутрішніх і зовнішніх паразитів (бліх, кліщів, гельмінтів)
- Зовнішнє застосування — за допомогою спеціального аплікатора — легко для Вас, мінімум стресу для Вашого кота
- Для кошенят з 7 тижнів і дорослих котів
- Інноваційний аплікатор — акуратність в застосуванні і точність дозування
- Нові показання до застосування: Нотоєдрос



СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ



1. Розрізати blister ножицями по лінії відрізу. Дістати аплікатор з упаковки.



2. При вертикальному положенні аплікатора відтягнути поршень назад.



4. Розсунути шерсть по середній лінії шиї між основою черепа і лопатками і видавити весь вміст аплікатора безпосередньо на шкіру в одне місце.

Бродлайн (розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення) належить до комбінованих протипаразитарних лікарських препаратів. До складу препарату входять фіпроніл, (5)-метопрен, епріномектин і празіквантел, які забезпечують його широкий спектр дії відносно екто- і ендопаразитів котів: бліх *Ctenocephalides* spp. (статевозрілі і преімагінальні фази розвитку бліх); волосоїдів *Felicola subrostratus*, нотоєдрос *Notoedres cati*; іксодових кліщів *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*, *Haemaphysalis longicornis*, *Haemaphysalis flava*, *Haemaphysalis campulata*; шлунково-кишкових нематод *Toxocara cati* (личинки 13, 14, нестатевозрілі і дорослі форми), *Ancylostoma tubaeforme* (личинки 14 і дорослі форми), *Toxascaris leonina* і *Ancylostoma braziliense*, *Troglostrongylus brevior* (статевозрілі форми); нематод сечового міхура *Capillaria plicca*; легеневи нематод *Aelurostrongylus abstrusus*, *Capillaria* spp.; личинок дифіларії *Dirofilaria immitis*; цестод *Dipylidium caninum*, дорослі *Joyeuxiella pasqualei* та *Joyeuxiella fuhmanni*, *Taenia* forms, *Echinococcus multilocularis* (всі стадії розвитку).

Бродлайн застосовується щомісяця. Перед застосуванням уважно прочитайте листівку-вкладку.

РП: AA-06095-03-15

UA-FEL-0003-2021

¹Bussi ras et al, 1997; ²Beugnet et al, 2000; ³Mircean et al, 2010; ⁴Barutski and Schaper, 2011; ⁵Capari et al, 2013

⁶Beck et al, 2006; ⁷Bonds et al, 2007; ⁸Farkas et al, 2008; ⁹Beugnet et al, 2010

Broadline®

Ефективний захист
від 22 внутрішніх і зовнішніх паразитів



ЗОВНІШНІ
ПАЗАЗІТИ

ВНУТРІШНІ
ПАЗАЗІТИ

Для тих, хто любить котів



Офіційний дистрибутор в Україні
TRIPLEX
ANIMAL HEALTH AND PRODUCTIVITY

49098, Україна
м. Дніпро
пров. Любарського, 12а
тел.: +38 (0562) 35-00-08
www.zoo.triplex.com.ua



**Boehringer
Ingelheim**



**Boehringer
Ingelheim**

ВНУТРІШНІ ПАРАЗИТИ

До 30% котів
заражені
гельмінтами¹



Більше 10 видів гельмінтів
паразитують в організмі кота

4 з НИХ Є СПІЛЬНИМИ
ДЛЯ КОТА І ЛЮДИНИ



**Ризик зараження гельмінтами
зростає, якщо:**

- відсутня регулярна профілактика
гельмінтів
- кіт харчується сирогою рибою і м'ясом
- коту дозволяють контакт з їжею
людини
- у власника немає звички **мити руки**
після спілкування з котом
- **власник не використовує рукавиці**
при очищенні котячого лотку

СИМПТОМИ

Внутрішні паразити

- Виснаження
- Тьмяна шерсть
- Розлад травлення
- Блювота

Зовнішні паразити

- Тьмяна шерсть
- Подрипини
- Занепокоєння
- Анемія

Симптоми можуть
не проявлятися
тривалий час



Особливо важливо, якщо:

- Кіт активно гуляє і полює на вулиці
- Вік кота до 6 місяців
- Кіт живе в сім'ї, де є маленькі діти
- В будинку утримується більше однієї тварини

ЗОВНІШНІ ПАРАЗИТИ

До 70% котів
заражені
блохами²



Блохи - одна з основних причин
алергічного дерматиту

Блохи є переносниками
інфекційних захворювань:

- рикетсіоз
- мікоплазмоз
- феліноз або «хвороба котячих
подрипин» (**гострого інфекційного**
захворювання людини, спричиненого
бактерією Бартоnella)



Іксодові кліщі викликають
занепокоєння котів укусами
і є **переносниками хвороби**
Лайма (бореліоз) - також **спільної**
для людини і кота



Домашні коти **СХИЛЬНІ ДО РИЗИКУ ЗАРАЖЕННЯ** гельмінтами і блохами.
Яйця бліх і гельмінтів можна занести в будинок на взутті або одязі.

СИМПТОМИ ЗАРАЖЕННЯ КОТА ПАРАЗИТАМИ МОЖУТЬ БУТИ НЕ ПОМІТНИМИ ТРИВАЛИЙ ЧАС.

ЦЕ ВАЖЛИВО!